

Exercice 1 : (3 points)

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des trois propositions est exacte.
(Aucune justification n'est demandée)

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{100} - e^x =$

A $+\infty$

B $-\infty$

C 0

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x^2} - 1}{\sin^2 x} =$

A 1

B 2

C 4

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x =$

A 1

B e

C $+\infty$

4. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt =$


A $\frac{1}{6}$

B $\frac{1}{1+e}$

C $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

5. Dans la figure ci-contre, Γ est la courbe d'une fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = a^x$ alors $a =$

- A 0,6
- B 1,6
- C 2,6



Exercice 2 : (4 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \overline{O\vec{i}}, \overline{O\vec{j}})$. On donne les points A , B et C d'affixes respectives $1 + 2i$, $5 - 2i$ et -1 . Soit f l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = \frac{1}{2}i\bar{z} - 1 + \frac{1}{2}i$.

1. Montrer que f est une similitude indirecte dont on précisera le rapport . Vérifier que le point C est le centre de f et que son axe Δ a pour équation $y = x + 1$.
2. Soit g la similitude indirecte qui transforme O en C et A en B.
 - a. Donner l'écriture complexe de g .
 - b. On pose $h = fog$. Soit M un point quelconque du plan, d'affixe z , On désigne par M' son image par h et on note z' l'affixe de M'.
Montrer que $z' = (1+i)z - 1$ puis caractériser h .
3. Soit M un point d'affixe z , on note x la partie réelle z et y sa partie imaginaire. On pose $M' = h(M)$.
 - a. Montrer que les vecteurs $\overline{OM'}$ et \overline{OB} sont orthogonaux si et seulement si : $3x - 7y = 5$.
 - b. Déterminer alors tous les points M d'affixe z à l'intérieur du cercle de centre O et de rayon 15 tels que les vecteurs $\overline{OM'}$ et \overline{OB} soient orthogonaux et $x, y \in \mathbb{Z}$.

Exercice 3 : (3 points)


1. a. Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, le couple $(14n + 3, 21n + 4)$ est solution de l'équation (E) : $3x - 2y = 1$.
b. En déduire $(14n + 3) \wedge (21n + 4)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$
2. Pour tout entier naturel n , on pose $d = (2n + 1) \wedge (21n + 4)$.
 - a. Montrer que $d = 1$ ou $d = 13$.
 - b. Montrer que $d = 13$ si et seulement si $n \equiv 6[13]$
3. Pour tout entier naturel n distinct de 1, on pose $A = 21n^2 - 17n - 4$ et $B = 28n^3 - 8n^2 - 17n - 3$.
 - a. Montrer que A et B sont divisibles par $(n-1)$.
 - b. Déterminer suivants les valeurs de n , $A \wedge B$.

Exercice 4 : (5 points)

Dans la figure ci-dessous ABCDEFGH un parallélépipède droit tels que $AB = AD = \frac{AE}{2} = 1$.

On désigne par M le point de l'arête [DC] tel que $\overline{DM} = \frac{1}{3}\overline{DC}$.

- Montrer que les droites (CE) et (FM) se coupent en un point I.
 - On désigne par h l'homothétie de centre I qui transforme C en E. Déterminer $h((CD))$ et $h((FM))$, en déduire $h(M)$.
 - Prouver h est de rapport $-\frac{3}{2}$.
- Soit J le milieu du segment [AE], on munit l'espace du repère orthonormé direct $(A, \overline{AB}, \overline{AJ}, \overline{AD})$.
 - Vérifier que le point I a pour coordonnées $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5})$.
 - On pose $N(1, 0, \frac{1}{3})$, montrer que $h(N) = H$.
- Déterminer les composantes du vecteur $\overline{IC} \wedge \overline{IM}$, en déduire l'aire du triangle IMC.
 - Calculer le volume du tétraèdre IMCN. en déduire le volume du tétraèdre IFEH.
- Soit S l'ensemble des points $M(x,y,z)$ tels que : $x^2 + y^2 + z^2 - \frac{6}{5}x - \frac{4}{5}y - \frac{6}{5}z + \frac{18}{25} = 0$
 - Montre que S est une sphère dont on précisera le centre et le rayon.
 - Vérifier que le point $I \in S$ et que S est tangente au plan (ABC).
 - On pose $h(S) = S'$. Montrer que S' est tangente au plan (EFH) en un point dont on précisera les coordonnées et qu'elle est extérieurement tangente à la sphère S.



Exercice 5:(5 points)

Soit n un entier naturel non nul et f_n la fonction définie sur $[0,1]$ par : $f_n(x) = \sqrt{x^n} e^{-\frac{x}{2}}$

On désigne par Γ_n la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , et par S_n le solide de révolution obtenu par rotation de Γ_n autour de l'axe (OX) . Pour tout entier $n \geq 1$ on désigne par V_n le volume du solide S_n . On a représenté ci-dessous (**Figure1**) les courbes $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4, \Gamma_5$ et $\Gamma_6 \dots$

1. Que peut-on conjecturer quant à la monotonie et la convergence de la suite (V_n) ?
2. a. Calculer V_1 .
 b. Montrer que la suite (V_n) est monotone, en déduire qu'elle est convergente.
 c. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ $V_{n+1} = -\frac{\pi}{e} + (n+1)V_n$.
 d. En déduire que pour tout entier $n \geq 1$ $\frac{\pi}{e(n+1)} \leq V_n \leq \frac{\pi}{en}$. Déterminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$.
3. Pour tout entier $n \geq 1$ on pose $U_n = \frac{V_n}{n!}$.
 a. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ $U_{n+1} = -\frac{\pi}{e(n+1)!} + U_n$.
 b. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ $V_n = \pi n! (1 - \frac{1}{e} \sum_{p=0}^n \frac{1}{p!})$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^n \frac{1}{p!}$.
 c. Calculer le volume de la partie de l'espace comprise entre les solides S_2 et S_5 . (**Figure2**)

Figure 1




Figure 2

