

Exercice1**A) (Bac Sc Juin 2011-contrôle)**

Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.

- 1) Le nombre $\left(\cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}\right)^5$ est un réel.
- 2) Les solutions dans \mathbb{C} de l'équation $z^2 - 6z - 7 + i = 0$ sont $1 + 2i$ et $-1 + 3i$.
- 3) Soit z et z' deux nombres complexes non nuls. Si $\arg(z') \equiv -\arg(z)[2\pi]$ alors $z' = \bar{z}$.
- 4) L'écriture exponentielle du nombre complexe $(\sqrt{3} + i)^8$ est $2^8 e^{i\frac{4\pi}{3}}$.

B) (Bac Tech Juin 2010-contrôle)

- 1) L'équation $(z - i)(z^2 + 4) = 0$ admet dans \mathbb{C} :
 - a) une unique solution
 - b) exactement deux solutions
 - c) exactement trois solutions.
- 2) Le nombre complexe $(1 - i) \cdot e^{i\frac{\pi}{4}}$ est égal à :
 - a) 2
 - b) $\sqrt{2}$
 - c) $2i$

C) (Bac Tech Juin 2009-contrôle)

- 1) La forme exponentielle du nombre complexe $-\sqrt{3} - i$ est :
 - a) $2e^{-i\frac{\pi}{6}}$
 - b) $2e^{i\frac{5\pi}{6}}$
 - c) $2e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.
- 2) Le conjugué du nombre complexe $1 + i \cdot z^2$ est :
 - a) $1 - i \cdot z^2$
 - b) $1 - i \cdot \bar{z}^2$
 - c) $-1 - i \cdot z^2$
- 3) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Le module du nombre complexe $1 + e^{i\theta}$ est :
 - a) $1 + |e^{i\theta}|$
 - b) $\sqrt{2}$
 - c) $\sqrt{2(1 + \cos \theta)}$.

D) (Bac Tech Juin 2008-principale)

- 1) La forme algébrique de $(3 - 2i)^2$ est :
 - a) $-5 + 12i$
 - b) $5 - 12i$
 - c) $5 + 12i$
- 2) La forme exponentielle du nombre complexe $-1 - i\sqrt{3}$ est :
 - a) $2e^{i\frac{4\pi}{3}}$
 - b) $2e^{i\frac{\pi}{3}}$
 - c) $2e^{i\frac{2\pi}{3}}$
- 3) Soit dans \mathbb{C} l'équation $(E): z^2 - (1 + 5i)z + 10i = 0$.
 - a) La somme des racines de (E) est égale à $-1 - 5i$.
 - b) Le produit des racines de (E) est égal à $10i$.
 - c) $2i$ est une racine de l'équation (E) .

Exercice2(Bac Sc Juin 2012- principale)

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) . On désigne par (\mathcal{C}) le cercle de centre O et de rayon 1 et par I et A les points d'affixes respectives 1 et $a = \sqrt{3} + i$.

- 1) a/ Donner la forme exponentielle de a .
- b/ Construire le point A .

2) Soit B le point d'affixe $b = \frac{a-1}{1-a}$.

a/ Vérifier que $b\bar{b} = 1$. En déduire que le point B appartient au cercle (\mathcal{C}).

b/ Montrer que $\frac{b-1}{a-1}$ est un réel. En déduire que les points A, B et I sont alignés.

c/ Construire le point B dans le repère $(O, \overset{1}{u}, \overset{1}{v})$.

3) Soit θ un argument du nombre complexe b . Montrer que $\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}-3}{5-2\sqrt{3}}$ et $\sin \theta = \frac{2-2\sqrt{3}}{5-2\sqrt{3}}$.

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par : $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

On désigne par C_f sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \overset{1}{i}, \overset{1}{j})$.

1. a. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. Interpréter graphiquement le résultat.

b. Montrer que la fonction f est continue à droite en 0.

c. Montrer que f est dérivable à droite en 0 et donner une équation de la demi-tangente à C_f au point O .

d. Montrer que $\forall x > 0, f'(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

e. Dresser le tableau de variation de f .

2. a. Montrer que f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ vers un intervalle J que l'on déterminera.

b. Montrer que $\forall x \in J, f^{-1}(x) = \frac{2x}{1-x^2}$. f^{-1} désigne la bijection réciproque de f .

c. Tracer les courbes C_f et (Γ) respectives de f et de f^{-1} dans le même repère.

Exercice 4

On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} U_0 \text{ donné} \\ U_{n+1} = U_n \sqrt{1+U_n} \end{cases}$.

1. On suppose que $U_0 = -\frac{1}{2}$.

a. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}; -1 < U_n < 0$.

b. Montrer que (U_n) est croissante.

c. En déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite.

2. On suppose que $U_0 > 0$.

a. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}; 0 < U_n$.

b. Montrer que (U_n) est croissante.

c. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}; U_{n+1} \geq \sqrt{1+U_0} \cdot U_n$.

d. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}; U_n \geq (\sqrt{1+U_0})^n \cdot U_0$ puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

NetSchool 1
KNOWLEDGE BASE