



Mathématiques

Classe : BAC

Chapitre : Limite et Continuité

Limite d'une fonction

Définition

Soit f une fonction numérique à variable réelle. a et ℓ sont deux réels.

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0$ tel que si $x \in D_f$ et $|x - a| < \alpha$ alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists \alpha > 0$ tel que si $x \in D_f$ et $|x - a| < \alpha$ alors $f(x) > A$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists \alpha > 0$ tel que si $x \in D_f$ et $|x - a| < \alpha$ alors $f(x) < -A$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists B > 0$ tel que si $x \in D_f$ et $x > B$ alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists B > 0$ tel que si $x \in D_f$ et $x < -B$ alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists B > 0$ tel que si $x \in D_f$ et $x > B$ alors $f(x) > A$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall A > 0, \exists B > 0$ tel que si $x \in D_f$ et $x > B$ alors $f(x) < -A$

Théorème

- Si une fonction f admet une limite alors cette limite est unique.
- Soit f une fonction définie et positive sur un intervalle I :
 - * Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\ell}$ (x_0 fini ou infini)
 - * Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = +\infty$ (x_0 fini ou infini)

Limites de fonctions trigonométriques

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1 & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2} &= \frac{a^2}{2} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x} &= a, (a \in \mathbb{R}) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} &= a, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{x} &= a \end{aligned}$$

Opérations sur les limites

x_0 désigne un nombre réel ou $+\infty$ ou $-\infty$; ℓ et ℓ' désignent des réels.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	ℓ	$\ell \neq 0$	0	∞	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$\ell \neq 0$	$\ell \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	ℓ'	0	0	0	∞	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$	$\ell + \ell'$	ℓ	0	∞	∞	$+\infty$	$-\infty$	F.I	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x)$	$\ell \cdot \ell'$	0	0	F.I	F.I	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$ (signe ℓ)	$\pm\infty$ (signe ℓ)
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{\ell}{\ell'} (\ell' \neq 0)$	∞	F.I	∞	0	∞	∞	∞	0	0

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) $	$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)}$
ℓ	$ \ell $	$\sqrt{ \ell }$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

Limite et ordre

f est une fonction, x_0 désigne un nombre réel ou $+\infty$ ou $-\infty$; ℓ et ℓ' désignent des réels et I désigne un intervalle ouvert de centre x_0 si $x_0 \in \mathbb{R}$ si non intervalle de type $]a, +\infty[$ ou $]-\infty, b[$.

Théorème 1

Si $\begin{cases} f \text{ est positive sur } I \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \end{cases}$ alors $\ell \geq 0$

Théorème 2

Si $\begin{cases} g(x) \leq f(x) \text{ sur un voisinage de } x_0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell, \ell \in \mathbb{R} \text{ et } \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \ell' \in \mathbb{R} \end{cases}$ alors $\ell' \leq \ell$

Théorème 3

Si $\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x), \text{ sur un voisinage de } x_0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \ell \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$

Théorème 4

Si $\begin{cases} |f(x) - \ell| \leq g(x) \text{ sur un voisinage de } x_0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

Théorème 5

S'il existe une fonction g vérifiant : $\begin{cases} f(x) \leq g(x) \text{ sur } I \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$

S'il existe une fonction g vérifiant : $\begin{cases} g(x) \leq f(x) \text{ sur } I \\ \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

Limite d'une fonction monotone

Théorème

Soit f une fonction définie sur un intervalle de type $[a, b[$ (fini ou infini).

- Si f est croissante et majorée alors elle admet une limite finie en b .
- Si f est croissante et non majorée alors f tend vers $+\infty$ en b .
- Si f est décroissante et minorée alors elle admet une limite finie en b .
- Si f est décroissante et non minorée alors f tend vers $-\infty$ en b .

Limite d'une fonction composée

Théorème 1

x_0 , b et λ désignent des réels ou $+\infty$ ou $-\infty$.
Si $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b \\ \lim_{x \rightarrow b} g(x) = \lambda \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = \lambda$

Corollaire

Si $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b, (b \in \mathbb{R}) \\ g \text{ est continue en } b \end{cases}$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = g(b)$

Théorème 2

- Soit f une fonction définie sur un intervalle de type $]a, +\infty[$.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ existe, signifie que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right)$ existe et dans ce cas, on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right)$
- Soit f une fonction définie sur un intervalle de type $]-\infty, a[$.
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ existe, signifie que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{x}\right)$ existe et dans ce cas, on a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{x}\right)$

Branches infinies

Asymptotes

Limite	Interprétation
$\lim_{x \rightarrow a} f = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f = \pm\infty$	La droite $D: x = a$ est asymptote à $\mathcal{C}$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f = b$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = b, b \in \mathbb{R}$	La droite $D: y = b$ est asymptote à $\mathcal{C}$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$	La droite $D: y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}$

Etude d'une branche infinie

Dans le cas où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$.

Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Dans ce qui suit le procédé qu'il faut suivre pour déterminer la branche infinie au voisinage de $+\infty$.

- * Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une branche infinie de direction asymptotique celle de $(O, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$.
- * Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une branche infinie de direction asymptotique celle de $(O, \vec{i})$ au voisinage de $+\infty$.
- * Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ avec $(a \neq 0)$, alors deux cas peuvent se présenter :
 - ✓ Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax = b$ avec $(b \in \mathbb{R})$ alors la droite d'équation $y = ax + b$ est une asymptote à la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.
 - ✓ Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax = \pm\infty$ alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une direction asymptotique celle de la droite d'équation $y = ax$ au voisinage de $+\infty$.



Continuité

Continuité d'une fonction composée

Si f est continue en x_0 et g est continue en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Si $\begin{cases} f \text{ est continue sur un intervalle } I \\ g \text{ est continue sur un intervalle } J \\ \text{pour tout } x \text{ de } I \text{ on a : } f(x) \in J \end{cases}$
alors $g \circ f$ est continue sur I .

Théorème 1

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Théorème 2 : (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a et b deux réels de I .
Pour tout réel λ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe au moins un réel $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = \lambda$.
Si de plus f est strictement monotone alors x_0 est unique.

corollaire

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé borné $[a, b]$ telle que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Il existe au moins un réel $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) = 0$.

Théorème 3

Toute fonction continue et ne s'annule pas sur un intervalle I alors elle garde un signe constant sur I .

Théorème 4

L'image d'un intervalle fermé borné $[a, b]$ par une fonction continue est un intervalle fermé borné $[m, M]$

Image d'un intervalle par une fonction monotone

Théorème

L'image d'un intervalle I par une fonction continue et monotone sur I est un intervalle de même nature.

Intervalle I	Si f est croissante sur I	Si f est décroissante sur I
$I = [a, b]$	$f(I) = [f(a), f(b)]$	$f(I) = [f(b), f(a)]$
$I = [a, b[$	$f(I) = [f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$f(I) =] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a)]$
$I = [a, +\infty[$	$f(I) = [f(a), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$f(I) =] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(a)]$
$I =]a, b]$	$f(I) =] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)]$	$f(I) =] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)]$

